

Examen Final : Algèbre 1

Durée : 1h30 min

Exercice 1 (05 pts).

Soient P et Q deux prédicats (propositions). On considère les connecteurs logiques et: \wedge , ou: \vee , implique: \Rightarrow , négation: \bar{P} . Compléter le tableau de vérité.

| P | Q | \bar{P} | \bar{Q} | $P \vee Q$ | $\bar{P} \vee Q$ | $P \Rightarrow Q$ | $\overline{P \vee Q}$ | $Q \Rightarrow \overline{P \vee Q}$ | $(Q \Rightarrow \overline{P \vee Q}) \wedge (P \vee Q)$ |
|-----|-----|-----------|-----------|------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |

Exercice 2 (05 pts).

On considère sur \mathbb{R} la loi de composition interne notée \star définie par:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x \star y = x + y + xy$$

1. Existe-t-il $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \star y = x, \forall y \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $(\mathbb{R} - \{-1\}, \star)$ est un groupe commutatif .
3. Calculer $1 \star (1 \times 1)$ et $(1 \star 1) \times (1 \star 1)$. La loi \star est-elle distributive par rapport a la multiplication ?.

Exercice 3 (05 pts).

On définit la relation binaire \mathfrak{R} sur l'ensemble des nombres réels \mathbb{R} comme suit:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x \mathfrak{R} y \iff x^3 - y^3 = x - y$$

1. Montrer que \mathfrak{R} est une relation d'équivalence.
2. Déterminer les classes d'équivalences $\bar{1}$ et $\bar{2}$.
3. Quelles sont les classes d'équivalence de cette relation. (Exactement deux éléments).

Exercice 4 (05 pts).

Soit $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ deux applications.
Démontrer que

1. La composée deux injections est une injection.
2. La composée deux surjections est une surjection.
3. Si la composition $g \circ f$ est injective alors f est injective.

Examen Final : Algèbre 1

Durée : 1h30 min

Exercice 1 (05 pts).

Soient P et Q deux prédicats (propositions). On considère les connecteurs logiques et: \wedge , ou: \vee , implique: \Rightarrow , négation: \bar{P} . Compléter le tableau de vérité.

| P | Q | \bar{P} | \bar{Q} | $P \vee Q$ | $\bar{P} \vee Q$ | $P \Rightarrow Q$ | $\overline{P \vee Q}$ | $Q \Rightarrow \overline{P \vee Q}$ | $(Q \Rightarrow \overline{P \vee Q}) \wedge (P \vee Q)$ |
|-----|-----|-----------|-----------|------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |

Exercice 2 (05 pts).

On considère sur \mathbb{R} la loi de composition interne notée \star définie par:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x \star y = x + y + xy$$

1. Existe-t-il $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \star y = x, \forall y \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $(\mathbb{R} - \{-1\}, \star)$ est un groupe commutatif .
3. Calculer $1 \star (1 \times 1)$ et $(1 \star 1) \times (1 \star 1)$. La loi \star est-elle distributive par rapport a la multiplication ?.

Exercice 3 .(05 pts).

On définit la relation binaire \mathfrak{R} sur l'ensemble des nombres réels \mathbb{R} comme suit:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x \mathfrak{R} y \iff x^3 - y^3 = x - y$$

1. Montrer que \mathfrak{R} est une relation d'équivalence.
2. Déterminer les classes d'équivalences $\bar{1}$ et $\bar{2}$.
3. Quelles sont les classes d'équivalence de cette relation. (Exactement deux éléments).

Exercice 4 .(05 pts).

Soit $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ deux applications.
 Démontrer que

1. La composée deux injections est une injection.
2. La composée deux surjections est une surjection.
3. Si la composition $g \circ f$ est injective alors f est injective.

Exo:01. Soient p et φ deux propositions

| p | φ | \bar{p} | $\bar{\varphi}$ | $p \vee \varphi$ | $\bar{p} \vee \varphi$ | $p \Rightarrow \varphi$ | $\overline{\bar{p} \vee \varphi}$ | $\varphi \Rightarrow \overline{\bar{p} \vee \varphi}$ | $(\varphi \Rightarrow \overline{\bar{p} \vee \varphi}) \wedge (p \vee \varphi)$ |
|-----|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

$\textcircled{01}$
 $\textcircled{01}$
 $\textcircled{01}$
 $\textcircled{01}$
 $\textcircled{01}$
 $\textcircled{01}$
 $\textcircled{01}$
 $\textcircled{01}$
 $\textcircled{01}$

Exercice n°02

$\forall x, y \in \mathbb{R}: x * y = x = x + y + xy$

$\Rightarrow y(1+x) = 0 \Rightarrow x = -1$

$(-1) * y = -1 + y - y = -1 \quad \forall y \in \mathbb{R}, \textcircled{01}$

$\mathbb{R} - \{-1\}, *$ groupe commutatif.

- commutativité:

$x * y = x + y + xy = y + x + yx = y * x \Rightarrow *$ est commutative. $\textcircled{01}$

- associativité: $\forall x, y, z \in \mathbb{R} - \{-1\}$

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= (x + y + xy) * z \\ &= x + y + xy + z + (x + y + xy)z \\ &= x + y + xy + z + xz + yz + xyz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * (y + z + yz) \\ &= x + y + z + yz + x(y + z + yz) \\ &= x + y + z + yz + xy + xz + xyz \\ &\Rightarrow * \text{ est associative. } \end{aligned}$$

$\textcircled{01}$

- Élément neutre :

Soit e l'élément neutre s'il existe \Rightarrow

$$\forall x \in \mathbb{R} : x * e = x = x + e + ex$$

$$\Rightarrow e(1+x) = 0 \Rightarrow e = 0$$

- Élément symétrique :

Soit x' le symétrique de x .

$$\Rightarrow x * x' = e = 0 = x + x' + xx'$$

$$\Rightarrow x'(1+x) = -x \Rightarrow x' = \frac{-x}{1+x}$$

Donc pour $x \neq -1$; $x' = \frac{-x}{1+x}$

finalemant $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ est un groupe commutatif.

3/ $1 * (1 * 1) = (1 * 1) = 1 + 1 + 1 = 3$

et

$$(1 * 1) * (1 * 1) = 3 * 3 = 9. \text{ On a } 1 * (1 * 1) \neq (1 * 1) * (1 * 1)$$

La loi $*$ n'est donc pas distributive par rapport à la multiplication \times .

Exercice N° 03

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x^3 - y^3 = x - y$$

1/ Soient x, y et z dans \mathbb{R} .

a) $x^3 - x^3 = 0 = x - x \Rightarrow x \mathcal{R} x$, d'où \mathcal{R} est réflexive.

b) $x \mathcal{R} y \Rightarrow x^3 - y^3 = x - y \Rightarrow -x^3 + y^3 = -x + y$

$$\Rightarrow y^3 - x^3 = y - x \Rightarrow y \mathcal{R} x$$

d'où \mathcal{R} est symétrique.

$$c) \begin{cases} x \neq y \\ \text{et} \\ y \neq z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^3 - y^3 = x - y \\ \text{et} \\ y^3 - z^3 = y - z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^3 - z^3 = x - z \\ \text{et} \\ x \neq z \end{cases}$$

d'où \neq est transitif

Donc: a), b) et c) $\Rightarrow \neq$ est une relation d'équivalence.

2/ $x \in \bar{1} \Leftrightarrow x^3 - 1 = x - 1 \Leftrightarrow (x-1)(x^2+x) = 0$
 $\Leftrightarrow x = 0, 1 \text{ ou } -1$ donc $\bar{1} = \{0, 1, -1\}$.

$$\begin{array}{r|l} x^3 - x & x-1 \\ \hline 0 & x^2+x \end{array}$$

$$x \in \bar{2} \Leftrightarrow x^3 - 2^3 = x - 2 \Leftrightarrow x^3 - x - 6 = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - x - 6 & x-2 \\ \hline 0 & x^2+4x+3 \end{array}$$

$$(x-2)(x^2+4x+3) = 0$$

$$\Rightarrow x=2 \text{ car } x^2+4x+3 \neq 0$$

donc: $\bar{2} = \{2\}$.

3/ Les classes d'équivalence

soit: $x \in \bar{a} \Leftrightarrow x^3 - a^3 = x - a \Leftrightarrow x^3 - x - a^3 + a = 0$
 $\Leftrightarrow (x-a)(x^2+ax+a^2-1) = 0$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - x - a^3 + a & x-a \\ \hline 0 & x^2+ax+a^2-1 \end{array}$$

$\Leftrightarrow x=a$ ou $x^2+ax+a^2-1=0$, donc \bar{a} contient deux

éléments si et seulement si

$$\Delta = -3a^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow a = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \bar{a} = \left\{ -\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right\}$$

Exercice n° 6

Soit $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$

1/ Soit x_1 et x_2 deux éléments de E tel que

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)).$$
 Comme g est injective

$$f(x_1) = f(x_2).$$
 Comme f est injective $x_1 = x_2$.

Cela prouve que $g \circ f$ est injective.

2/ Démontrons que la composée de deux surjectifs est une surjectif.

Comme g est surjective, $\forall c \in G$ il existe au moins un élément $b \in F$ tel que $g(b) = c$.

Comme f est surjective, il existe au moins un élément $a \in E$ tel que $f(a) = b$. Donc:

$\forall c \in G$ il existe au moins un élément $a \in E$ tel que

$$g(f(a)) = c.$$
 Cela prouve que $g \circ f$ est surjective.

3/ Démontrons que $g \circ f$ est injective $\Rightarrow f$ est injective.

Soit $x_1, x_2 \in E$ tel que

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)).$$
 par hypothèse

$g \circ f$ est injective, donc $x_1 = x_2$. cela implique que f est injective.

merci