

Examen final.
Algèbre 1

Exercice 01 :

1. Soient P, Q deux propositions.

(a) À l'aide de la table de vérité, vérifier que :

$$\overline{(P \wedge Q)} \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$$

2. Démontrer par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2^n > n$.

3. Soient A, B deux parties non vide d'un ensemble E .

(a) Trouver l'expression de la différence symétrique $A \Delta B$.

(b) Déduire l'expression de la différence symétrique $A \Delta B$, pour $A \cap B = \emptyset$.

Exercice 02 :

Soit \mathcal{R} , la relation définie sur \mathbb{R}^* par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x - \frac{1}{x} = y - \frac{1}{y}.$$

1. Montrer que \mathcal{R} est une relation d'équivalence.

2. Déterminer la classe d'équivalence de $a \in \mathbb{R}^*$, puis trouver l'ensemble quotient \mathbb{R}^*/\mathcal{R} .

Exercice 03 :

1. Soit $G = \mathbb{R}$, on définit sur G la loi de composition interne $*$ définie par :

$$\forall x, y \in G, x * y = x + y - \frac{1}{2}.$$

(a) Montrer que $*$ est une loi commutative.

(b) Montrer que $(G, *)$ est un groupe.

2. Soit,

$$f : (G, *) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$$

$$x \longmapsto f(x) = 2x - 1.$$

(a) Montrer que f est homomorphisme de groupe.

(b) L'application f est-elle bijective ? justifier.

(c) Déduire un autre nom pour l'application f .

Exercice 04 : On considère le polynôme $P(X)$ de $\mathbb{R}[X]$, qui s'écrit,

$$P(X) = X^3 + 2X^2 + aX + b.$$

1. Déterminer les valeurs de a et b pour que $P(X)$ admette i comme racine dans \mathbb{C} .

الإمتحان النهائي
الجبر ١

التمرين الأول:

(١). لتكن P, Q قضيتين.

١. بالإستعانة بجدول الحقيقة. تحقق أن :

$$\overline{(P \wedge \overline{Q})} \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$$

(٢). برهن بالتراجع ان : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2^n > n$.

(٣). لتكن A, B جزئين غير خاليين من المجموعة E .

١. هات عبارة الفرق التناظري $A \Delta B$.

ب. استنتج الفرق التناظري $A \Delta B$ ، من أجل $A \cap B = \emptyset$.

التمرين الثاني:

لتكن \mathcal{R} ، علاقة معرفة على \mathbb{R}^* ب :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x - \frac{1}{x} = y - \frac{1}{y}.$$

(١). برهن أن \mathcal{R} هي علاقة تكافؤ.

(٢). حدد أصناف التكافؤ لـ: $a \in \mathbb{R}^*$ ، ثم أوجد مجموعة حاصل القسمة \mathbb{R}^*/\mathcal{R} .

التمرين الثالث:

(١). لتكن $G = \mathbb{R}$ ، نعرف على G علاقة تركيب داخلية $*$ كما يلي :

$$\forall x, y \in G, x * y = x + y - \frac{1}{2}.$$

١. برهن ان $*$ هي علاقة تبديلية.

ب. برهن ان $(G, *)$ هي زمرة.

(٢). ليكن،

$$f : (G, *) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$$

$$x \longmapsto f(x) = 2x - 1.$$

١. برهن أن f هو تشاكل لزمرة.

ب. التطبيق f تقابلي ؟ برر.

ج. استنتج اسم آخر للتطبيق f .

التمرين الرابع: نعتبر كثير الحدود $P(X)$ في $\mathbb{R}[X]$ ، الذي يكتب ،

$$P(X) = X^3 + 2X^2 + aX + b.$$

- حدد قيمة a و b من أجل $P(X)$ يقبل i جذرا له في \mathbb{C} .

Corrigé type d'examen final.

Algèbre 1

Correction de l'exercice 01 :

1. Soient P, Q deux propositions.

(a) À l'aide de la table de vérité, montrer que : $\overline{(P \wedge \overline{Q})} \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$.

P	Q	\overline{P}	\overline{Q}	$P \wedge \overline{Q}$	$\overline{P \wedge \overline{Q}}$	$\overline{P} \vee Q$	$(P \wedge \overline{Q}) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$
1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1

2. Par récurrence démontrons que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2^n > n$.

Soit $P(n)$ la propriété : $2^n > n$.

- Pour : $n = 1, 2^1 = 2 > 1$, c'est vraie. **0.5**
- Supposons que, $P(n)$ est vraie.i.e : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2^n > n$.
- Démontrons que, $P(n + 1)$ est vraie.i.e : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2^{n+1} > n + 1$.

Nous avons,

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n > 2n, \quad \mathbf{0.5}$$

et on a, pour tout n de \mathbb{N}^* , $2n > n + 1$. Donc,

$$2^{n+1} > n + 1, \quad \mathbf{0.5}$$

$P(n + 1)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie pour tout n de \mathbb{N}^* .

3. Soient A, B deux parties non vide d'un ensemble E .

(a) L'expression de la différence symétrique $A \Delta B$.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) \quad \mathbf{0.5}$$

(b) Dédurre l'expression de la différence symétrique $A \Delta B$, pour $A \cap B = \emptyset$.

Si : $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow (A - B = A, \text{ et } B - A = B)$. Donc,

0.5

$$A \Delta B = A \cup B \quad \mathbf{0.5}$$

Correction de l'exercice 02 :

Soit \mathcal{R} , la relation définie sur \mathbb{R}^* par :

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x - \frac{1}{x} = y - \frac{1}{y}.$$

1. \mathcal{R} est une relation d'équivalence.

(a) \mathcal{R} est réflexive car,

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, x - \frac{1}{x} = x - \frac{1}{x} \Leftrightarrow x \mathcal{R} x$$

ce qui montre que \mathcal{R} est réflexive. **01**

(b) \mathcal{R} est symétrique car on a,

$$\begin{aligned}\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x\mathcal{R}y &\Leftrightarrow x - \frac{1}{x} = y - \frac{1}{y}, \\ &\Leftrightarrow y - \frac{1}{y} = x - \frac{1}{x}, \\ &\Leftrightarrow y\mathcal{R}x.\end{aligned}$$

donc

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow y\mathcal{R}x.$$

ce qui montre que \mathcal{R} est **symétrique**. 01

(c) \mathcal{R} est transitive car on a,

$$\begin{aligned}\forall x, y, z \in \mathbb{R}^*, x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z &\Leftrightarrow x - \frac{1}{x} = y - \frac{1}{y} \wedge y - \frac{1}{y} = z - \frac{1}{z}, \\ &\Rightarrow x - \frac{1}{x} + \cancel{y - \frac{1}{y}} = \cancel{y - \frac{1}{y}} + z - \frac{1}{z}, \\ &\Rightarrow x - \frac{1}{x} = z - \frac{1}{z}, \\ &\Rightarrow x\mathcal{R}z.\end{aligned}$$

donc

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}^*, x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$$

ce qui montre que \mathcal{R} est **transitive**. 01

De (a), (b) et (c), on déduit que \mathcal{R} est une relation d'équivalence.

2. Déterminons :

(a) La classe d'équivalence de $a \in \mathbb{R}^*$. Nous avons,

$$\dot{a} = \{x \in \mathbb{R}^*, x\mathcal{R}a\}$$

alors,

$$\begin{aligned}x\mathcal{R}a &\Leftrightarrow x - \frac{1}{x} = a - \frac{1}{a}, \quad \mathbf{0.5} \\ &\Leftrightarrow x - \frac{1}{x} - a + \frac{1}{a} = 0, \\ &\Leftrightarrow \frac{ax^2 - (a^2 - 1)x - a}{ax} = 0, \text{ et } ax \neq 0, \\ &\Leftrightarrow ax^2 - (a^2 - 1)x - a = 0. \quad \mathbf{0.5}\end{aligned}$$

$$\Delta = a^4 + 2a^2 + 1 = (a^2 + 1)^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = a^2 + 1. \quad \mathbf{0.5}$$

$$\begin{aligned}x &= \frac{a^2 - 1 + a^2 + 1}{2a} = \frac{2a^2}{2a} = a, \quad \mathbf{0.5} \\ &\quad \vee \\ x &= \frac{a^2 - 1 - a^2 - 1}{2a} = -\frac{2}{2a} = -\frac{1}{a}. \quad \mathbf{0.5}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\dot{a} = \left\{ a, -\frac{1}{a} \right\}$$

(b) L'ensemble quotient \mathbb{R}^*/\mathcal{R} D'après les classes d'équivalence de a , ($a \in \mathbb{R}^*$), par suite

$$\mathbb{R}^*/\mathcal{R} = \left\{ \left\{ a, -\frac{1}{a} \right\}, a \in \mathbb{R}^* \right\}. \quad \mathbf{0.5}$$

Correction de l'exercice 03 :

1. Soit $G = \mathbb{R}$, la loi de composition interne $*$ définie sur G par :

$$\forall x, y \in G, x * y = x + y - \frac{1}{2}.$$

(a) $*$ est une loi commutative. Nous avons,

$$\forall x, y \in G, x * y = x + y - \frac{1}{2} = y + x - \frac{1}{2} = y * x,$$

d'où,

$$\forall x, y \in G, x * y = y * x.$$

ce qui montre que $*$ est une loi **commutative**. **0.5**

(b) $(G, *)$ est un groupe.

i. $*$ est associative.

$$\forall x, y, z \in G, (x * y) * z = x * (y * z).$$

$$\text{A. } (x * y) * z = (x * y) + z - \frac{1}{2} = x + y - \frac{1}{2} + z - \frac{1}{2} = x + y + z - 1. \quad \mathbf{0.5}$$

$$\text{B. } x * (y * z) = x + (y * z) - \frac{1}{2} = x + y + z - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = x + y + z - 1. \quad \mathbf{0.5}$$

De A. et B., on déduit que $*$ est **associative**.

ii. $*$ admet élément neutre. Soit e est un élément neutre de $*$ dans G , et comme la loi $*$ est commutative, on a :

$$\forall x \in G, x * e = e * x = x$$

$$x * e = x \Leftrightarrow x + e - \frac{1}{2} = x \Leftrightarrow e = \frac{1}{2} \in G. \quad \mathbf{01}$$

iii. $*$ admet un élément symétrique (Inverse). Soit $x \in G$, alors il existe un $x' \in G$ tel que :

$$x * x' = e = \frac{1}{2}.$$

$$x * x' = \frac{1}{2} \Rightarrow x + x' - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow x' = 1 - x \in G. \quad \mathbf{01}$$

De i., ii. et iii., on déduit que $(G, *)$ est un groupe.

2. Soit,

$$\begin{aligned} f : (G, *) &\longrightarrow (\mathbb{R}, +) \\ x &\longmapsto f(x) = 2x - 1. \end{aligned}$$

(a) Montrons que f est homomorphisme de groupe. Soit $x, y \in G$, alors

$$\begin{aligned} f(x * y) &= 2(x * y) - 1 \\ &= 2\left(x + y - \frac{1}{2}\right) - 1 \\ &= (2x - 1) + (2y - 1) \\ &= f(x) + f(y) \quad \mathbf{01} \end{aligned}$$

(b) L'application f est bijective, car

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists! x \in G, y = f(x). \quad \mathbf{0.5}$$

Pour tout $y \in \mathbb{R}$, l'équation $y = 2x - 1$ admet solution unique $x = \frac{y+1}{2} \in G$. **0.5**

(c) Comme l'application f est homomorphisme et bijective alors f est **isomorphisme**. **0.5**

Correction de l'exercice 04 : Soit le polynôme $P(X)$ de $\mathbb{R}[X]$

$$P(X) = X^3 + 2X^2 + aX + b.$$

⊛ Déterminons les valeurs de a et b pour que $P(X)$ admette i comme racine dans \mathbb{C} .

$$\begin{aligned} \mathbf{0.5} \quad P(i) = 0 &\Leftrightarrow i^3 + 2i^2 + ai + b = 0, \\ &\Leftrightarrow -i - 2 + ai + b = 0, \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (b - 2) + (a - 1)i = 0. \quad \mathbf{0.5}$$

Donc,

$$b - 2 = 0, \wedge a - 1 = 0 \Rightarrow a = 1 \wedge b = 2. \quad \mathbf{0.5}$$